

Onderzoek aan Rosse Grutto's *Limosa lapponica*

In 2001 is door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gestart met een langlopend onderzoek naar de ecologie van de rosse grutto. Naast de kanoetstrandloper, die voornamelijk schelpdieren eet en waar we sinds eind jaren tachtig onderzoek aan verrichten, willen we meer te weten komen over de ecologie van een soort waarvan het stapelvoedsel bestaat uit borstelwormen. In mei 2001 is gestart met het kleurringen van rosse grutto's in de Nederlandse Waddenzee en op de Banc d'Arguin in Mauritanië, een van de belangrijkste overwinteringsgebieden van de soort in Afrika. Jaarlijks worden er vogels gevangen en gekleurringd door ringers van VRS Castricum, VRS Calidris op Schiermonnikoog en wilsterflappers Joop Jukema, Jaap Strikwerda, Bram van der Veen en Cees Dekker. Deze wilsterflappers ringen op de Waddeneilanden Texel, Terschelling en Ameland en vangen ieder voorjaar honderden rosse grutto's met behulp van een groot klapnet (wilsternet) in de weilanden. Ook worden er door het NIOZ steltlopers gevangen met mistnetten in de periodes rond nieuwe maan in het Waddengebied en in Mauritanië.

De kleurringcombinaties bestaan uit vier kleurringen en een vlag (een ring met een soort wimpel). De vlagkleuren die sinds 2001 worden gebruikt zijn weergegeven in figuur 2 en zijn in chronologische volgorde, Geel (Y), Rood (R), Lime (L), Zwart (N) en opnieuw Geel (Y). Aan beide poten zitten twee kleurringen aan het loopbeen (de tarsus) met een vlag op 8 mogelijke posities (zie figuur 1). Iedere vogel draagt een metalen ring, deze vormt geen onderdeel van de combinatie.

Sinds 2024 worden gele vlaggen gebruikt in combinatie met 4 kleurringen, de gebruikte kleuren zijn Zwart wat volgens internationale afspraken geschreven wordt als een N, Rood (R), Geel (Y), Groen (G) en licht blauw (P van Pale blue). Een rosse grutto met een rode kleurring boven een gele aan de linker poot en aan de rechter poot een gele vlag tussen twee groene kleurringen aan het loopbeen wordt genoteerd als Y6RYGG. Eerst wordt de positie van de vlag genoteerd en vervolgens de kleurringen van boven naar onder, eerst voor de linker poot en dan voor de rechter.

Sinds de invoer van zwarte vlaggen hebben we per gebied een eigen vlagpositie gebruikt, dit betekent dat je aan de positie van de vlag kunt herkennen waar een vogel geringd is. N1 is gebruikt op Texel, N2 in Mauritanië, N3 en N8 op Terschelling, N4 in Castricum, N5 op Ameland en N6 zijn vogels die met het mistnet gevangen zijn op Griend of op Schiermonnikoog. N7 is nog niet gebruikt. Per mei 2025 zijn er enkele combinaties gebruikt met Y2 in Mauritanië (17 combinaties beginnend met Y2GG) en zijn er 215 combinaties met Y6 uitgeven op Griend.


Waarnemingen van rosse grutto's kunnen worden opgestuurd naar shorebirds@nioz.nl met een beschrijving van de kleurringcombinatie, de datum en locatie. Aanvullende gegevens die we graag zouden ontvangen zijn: het type terrein, de groepsgrote en eventueel de ringdichtheid (het totaal aantal bekeken vogels en het aantal gekleurringde vogels) en het kleed (zomer of winterkleed indien mogelijk uitgedrukt in een percentage).

Kleurringen werden in de eerste jaren van het onderzoek gemaakt van een plastic dat Darvic wordt genoemd, momenteel gebruiken we een ander materiaal wat de eigenschappen van plexiglas heeft. Deze ringen hebben niet het eeuwige leven en gaan vaak minder lang mee dan de maximale levensduur van een rosse grutto. Dit betekent dat er onvolledige combinaties rondvliegen door ringverlies en dat sommige ringen sterk verkleurd kunnen zijn door aanslag of uitbleking als gevolg van ultraviolet licht. Mochten er vogels waargenomen worden met incomplete kleurringcombinaties


dan zouden we hiervan ook graag waarnemingen ontvangen, zo kunnen we een idee krijgen van het ringverlies. Van deze vogels is het belangrijk dat het geslacht wordt genoteerd, het verschil tussen mannen en vrouwen is in het veld goed te zien, vooral in het voorjaar wanneer de mannen een roodbruine kleur krijgen.

Het onderzoek aan rosse grutto's heeft ons veel geleerd over het gebiedsgebruik van de Waddenzee en de voedsel生态学. Dit samen met het grootschalige bemonsteringsprogramma SIBES dat sinds 2008 jaarlijks de verspreiding van het bodemleven op bijna alle droogvallende wadplaten in het Nederlandse Waddengebied in kaart brengt. Op deze manier kunnen we het voedsellandschap voor een soort in kaart brengen, waardoor we de verspreiding van rosse grutto's beter kunnen verklaren.


Met vriendelijke groet namens het NIOZ shorebirds team



Figuur 1 Mogelijke posities van de vlag



Figuur 2 Gebruikte vlagkleuren en de bijbehorende kleuren die vanaf 2001 zijn gebruikt. Vogels die momenteel worden geringd krijgen een zwarte vlag.



Figuur 3 Een voorbeeld van een gekleurringde rosse grutto Y2BRYR, deze is waargenomen en getekend in de Somone Lagoon in Senegal op 24 januari 2014 door John Wright.